

(93)

Ist das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses imstande, die Huntington-Chorea-Familien zum Aussterben zu bringen?

Lane Medical Library

Inaugural-Dissertation

zur Erlangung der Doktorwürde
einer Hohen medizinischen Fakultät
der Friedrich-Alexanders-Universität zu Erlangen

vorgelegt von

Martin Herrmann

aus Vohburg a. Donau.

Tag der mündlichen Prüfung: 18. März 1935.

Buchdruckerei Robert Windsheimer, Erlangen-Bruck.

1935

1935/345

Referent: Geheimrat Prof. Dr. G. Specht.
Dekan: Geheimrat Prof. Dr. Fr. Jamin.

Meinen lieben Eltern.



Digitized by the Internet Archive
in 2026

Die Menschheit hat schon in frühesten Zeiten die schicksalbestimmende Bedeutung der Vererbung erkannt; aber man war nicht in der Lage, sie auch nur einigermaßen wissenschaftlich zu erklären. Erst die ernsthafte Forschung der letzten Jahrzehnte brachte in erstaunlich fruchtbarer Arbeit Licht in das geheimnisvolle Dunkel. Es braucht nur auf *Gregor Mendel*, den Gesetzgeber der Vererbungslehre und *Francis Galton* (1822—1911), den Schöpfer der Lehre der Eugenik und die auf diese grundlegenden Arbeiten aufgebauten umfangreichen Forschungsergebnisse hingewiesen zu werden.

Mit der Machtübernahme des Nationalsozialismus sind erbbiologische und rassenhygienische Maßnahmen sehr aktuell.

Bereits im Jahre 1923 schreibt *Hitler* in seinem vielgelesenen Buch „Mein Kampf“: „Wer körperlich und geistig nicht gesund und würdig ist, darf sein Leiden nicht im Körper seines Kindes verewigen! Der Staat muß Sorge tragen, daß nur, wer gesund ist, Kinder zeugen darf. Umgekehrt aber muß es als verwerflich gelten, gesunde Kinder dem Staat vorzuenthalten! Die Forderung, daß defekten Menschen die Zeugung anderer defekter Nachkommen unmöglich gemacht wird, ist eine Forderung klarster Vernunft und bedeutet in ihrer planmäßigen Durchführung die humanste Tat der Menschheit. Sie wird Millionen von Unglücklichen unverdiente Leiden ersparen, in der Folge aber zu einer steigenden Gesundung überhaupt führen“.

Es war also nicht anders zu erwarten, als daß der Führer seinen Anschauungen durch die Tat Ausdruck verlieh, was durch das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses vom 14. Juli 1933 — ein bedeutender Schritt zur Erbgesundung des Volkes — geschah, unter der Voraus-

setzung, daß es heute möglich ist, in bestimmten Fällen den zukünftigen Wert des Nachwuchses vorauszusagen, abgesehen von der Feststellung der Gesetzmäßigkeit der Vererbung selbst.

In neuerer Zeit wurde die erbbiologische Forschung durch Arbeiten von *Plötz*, *Schallmeyer*, *Correns*, *de Vries*, *Tschermak*, *Baur*, *Rüdin*, *Fischer*, *Lenz* u. a. gefördert. Der Altvater der Münchener Rassenhygieniker, *Alfred Plötz*, sagt einmal: „Das Volk, das zuerst entschlossen den Weg der Rassenhygiene beschreiten wird, wird den anderen in seinem Aufstieg weit vorausseilen“. Die Hauptaufgabe eines bewußt rassistisch eingestellten Volkes liegt im Emporheben des Menschen. Und wenn *Oswald Spengler* in seinem viel Aufsehen erregenden Werk „Der Untergang des Abendlandes“ uns keine Chance zum Wiederaufstieg mehr gibt und uns zwingen will, den unbegreiflichen und unbegriffenen Niedergang als unabwendbares Schicksal hinzunehmen, so werden wir uns dagegen wehren und mit aller Kraft das drohende Unheil abzuwenden versuchen, doch wohl bewußt, daß es ein schwerer Kampf ist, da — wie *Lenz* sagt — wir, in erster Linie wir Deutsche, tatsächlich in jeder Hinsicht mitten in der größten Krise, welche die Menschheit je zu überwinden gehabt habe, stehen.

Wenn *Grotjahn*, ein der sozialdemokratischen Partei angehörender Rassenhygieniker, den Anteil der gesamten Minderwertigen auf etwa ein Drittel der Bevölkerung schätzt, so bedenke man, was das heißt, zumal wir annehmen dürfen, daß der größte Teil seine Leiden auf Grund von krankhaften Erbanlagen trägt. Obwohl uns diese Zahl als bei weitem zu hoch gegriffen erscheint, muß sie uns sehr bedenklich stimmen.

Seit Jahrhundertwende pflanzen sich nach *Walter Schultze* die Untüchtigen stärker fort als die Tüchtigen. Ziehen wir ferner in Betracht, daß die Fortschritte der Medizin, das Christentum, Wohlfahrtspflege, Fürsorge usw. ihr Möglichstes tun, um die Schwachen und Erbkranken zu pflegen — übrigens eine selbstverständliche Pflicht — und zur Fortpflanzung ihrer Leiden fast aufzumuntern, so kann der naturwidrige Vorgang der Gegenauslese nicht ausbleiben.

Auch der vergangene Krieg ist ein Musterbeispiel der Gegen-
auslese. An ihre Stelle die Ausmerze der Minderwertigen
zu setzen, ist die zwangsläufige Forderung einer logischen
Gesetzgebung.

Da die psychiatrische Erbprognostik noch eine sehr junge
Wissenschaft darstellt, müssen wir auch einsehen, daß wir
weit davon entfernt sind, normales und krankhaftes mensch-
liches Leben erbbiologisch voll zu durchschauen; aber immer-
hin können wir erfreulicherweise feststellen, daß wir doch
bereits in vielen Fällen bestimmte Zusammenhänge soweit
überblicken, um zu Eingriffen in den Fortgang von Fort-
pflanzungen berechtigt zu sein. Wir wissen jetzt, daß die
erbliche Konstitution aus einer sehr großen Anzahl von
Anlagen für verschiedene Eigenschaften und Organbildungen
besteht, daß diese in bestimmten Gruppen vereinigt, in klein-
sten Körperchen, den Chromosomen gelagert sind und die Ver-
teilung dieser Körperchen auch die Verteilung der Anlagen
bei der Vererbung ergibt. Befruchtung, Teilung und Reduk-
tionsteilung sind die Ursachen für die Vorgänge bei der Verer-
bung und die mannigfachen Kombinationen, die in der Nach-
kommenchaft irgendwelcher Ausgangsindividuen entstehen.

Angeichts der Unmöglichkeit die im Gesetz zur Ver-
hütung erbkranken Nachwuchses genannten Krankheiten auf
dem Weg der Therapie erfolgreich zu bekämpfen, ist es
unbedingt soziale Pflicht des Staates gegenüber dem Volk,
die Entstehung dieser Leiden durch gesetzliche Maßnahmen
möglichst zu verhindern. Eine Diskussion, ob die Sterilisa-
tion christlich oder unchristlich sei, ist nach *Rosenberg* heute
nicht mehr zulässig; sie würde auch außerhalb des Rahmens
meiner Arbeit liegen. In einigen Staaten wie Kanada,
Dänemark, Kanton Waadt in der Schweiz bestand schon
vor Deutschland ein Gesetz, in bestimmten Fällen die Steri-
lisierung bzw. die Kastration durchzuführen. Aber Deutsch-
land hat zweifellos durch sein großangelegtes eingreifendes
Unfruchtbarmachungs-gesetz die Aufmerksamkeit der ganzen
zivilisierten Welt auf sich gelenkt.

Im Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses fin-
den wir im § 1 Abs. 2 unter 5 Huntington'sche Chorea
(= erblicher Veitstanz).

Wird der Fortpflanzung dieser mit Recht hier angeführten, in ihrem Erbgang klar durchschauenden Krankheit durch das Gesetz tatsächlich Einhalt geboten?

Dies wollen wir in folgenden Zeilen etwas kritisch betrachten; doch vorher noch einiges über die Huntington'sche Chorea als Erbkrankheit. Früher warf man sämtliche Erkrankungen, bei denen man eigenartige, unwillkürliche Bewegungen beobachtete, in einen Topf. Die dadurch entstandene Verwirrung beseitigt und das Krankheitsbild des heutigen Veitstanzes oder der Chorea aus der Masse der Beobachtungen abgegrenzt zu haben, ist das große Verdienst *Sydenhams*. Auf eine besondere Form der Chorea wies im Jahre 1872 *George Huntington*, ein Arzt aus Long Island, hin, nachdem bereits vorher sein Landsmann *Dr. Waters* auf ähnliche Krankheitsfälle aufmerksam gemacht hatte. Die Mitteilungen Waters waren in Deutschland in Vergessenheit geraten, und den Veröffentlichungen Huntingtons wäre es wohl ebenso ergangen, wenn nicht ein kurzer Bericht über den wesentlichen Inhalt derselben in *Virchow-Hirsch's* Jahresbericht aufgenommen worden wäre. Der Originalbericht Huntingtons war in der Zeitschrift „*The medicinal and Surgical Report*“ erschienen und konnte lange Zeit nicht gefunden werden, da jene Zeitung längst nicht mehr existiert. Den Bemühungen *Steyerthals* gelang es, das Original ausfindig zu machen und im „*Archiv für Psychiatrie*“ in deutscher Übersetzung zu veröffentlichen. Huntington schreibt: „Die „*hereditäre*“ Chorea, wie ich diese Krankheit nennen möchte, zeigt die Symptome der gewöhnlichen Chorea, aber im verstärktem Maße und tritt *nie vor der Pubertät* auf. *Sie ist auf bestimmte Familien beschränkt, in denen sie seit undenklichen Zeiten von Generation zu Generation weitervererbt wird.* Männer werden häufiger befallen als Frauen. *Gehen Kinder, deren Eltern an Chorea hereditaria litten, durchs Leben, ohne ebenfalls zu erkranken, so ist der Bann gebrochen, und die Nachkommen erkranken niemals mehr an diesem Leiden.* Bei allen Kranken herrscht eine gewisse Reizbarkeit vor. Auffallend häufig treten bei ihnen Geistesstörungen mit

Neigung zum Selbstmord auf; je mehr die Krankheit zunimmt, desto mehr sinkt meist die Intelligenz. *Die Therapie erscheint machtlos zu sein. Der Ausgang und die Unheilbarkeit des Leidens ist den Angehörigen bereits so gut bekannt, daß ärztliche Hilfe nur selten in Anspruch genommen wird*“.

In Deutschland teilte *A. Ewald* im Jahre 1884 zwei hierher gehörige Fälle mit; *Hoffmann* schlug den Namen „Chorea chronica progressiva“ vor, da er den chronischen Verlauf für wichtiger hielt als die Heredität, die in vielen Fällen nicht vorhanden schien. Es würde zu weit führen, über die Ansichten der einzelnen Forscher wie *Sydenham*, *Charkot*, *Jolly*, *Zinn*, *Möbius*, *Viedens*, *Facklam*, *Wollenberg* usw. zu diskutieren; aber ich möchte nicht verjäumen, auf ein Hauptwerk der Huntington'schen Choreaforſchung, auf die im Jahre 1921 erschienene Beſchreibung dieſer Krankheit von *Entres* hinzuweiſen. Über den damaligen Stand der Kenntniſſe über den erblichen Veitſtanz unterrichtet uns *Entres* zu Beginn ſeiner Arbeit, indem er ſchreibt: „Dieſe Arbeit ſoll nur einen weitausholenden caſuiſtiſchen Beitrag zur Lehre von der Chorea Huntington darſtellen. Wenn es gelingen ſollte, im Nachſtehenden den erblichen Charakter der Huntingtonſchen Chorea zu erweiſen und ſie als eine Mendelſchen Vererbungsregeln ſtreng folgende Erkrankung von den anderweitigen Choreaformen ſcharf zu unterſcheiden, könnte Verfaſſer die Aufgabe, die er ſich geſtellt, als gelöſt betrachten“. Seine Bemühungen waren zweifellos von Erfolg gekrönt. Er weiſt darauf hin, daß bei kurſoriſcher Betrachtung des Erbganges folgende weſentliche Geſichtspunkte zu erwähnen ſeien:

1. Die Huntingtonſche Chorea vererbt ſich ſtets in direkter Linie.

2. Die Nachkommenſchaft geſund gebliebener Familienmitglieder iſt dauernd von der Krankheit verſchont.

3. Faſt in jeder Generation mit genügend großer Kinderzahl, die von einem kranken Elter abſtammt, finden ſich Choreakranke.

Heute ist unumstößbarer, *gesicherter Bestand der Wissenschaft*, daß die *Huntington'sche Krankheit*, eine *familiäre, chronisch-progressive Chorea* die im *dominanten Erbgang* entsteht.

Mag auch bei einigen Stammbäumen eine scheinbare Lücke in der direkten Vererbung bestanden haben, da der betreffende Elter eines Kranken frei von Chorea-symptomen war, aber in verhältnismäßig jüngeren Jahren starb, so kann man annehmen, daß er noch erkrankt wäre, wenn ihm ein höheres Alter beschieden gewesen wäre.

Über die motorischen und psychischen Symptome, das langsam zum Tode führende körperliche und geistige Siechtum, sowie Lokalisation und mikroskopisch-anatomische Bild des Gehirnprozesses zu sprechen, würde zu weit führen und liegt nicht im Rahmen meiner Arbeit.

In welchem Alter bricht nun die Krankheit gewöhnlich aus? Mit der Beantwortung dieser überaus wichtigen Frage fällt die Entscheidung über den mehr oder minder großen Erfolg des Sterilisierungsgesetzes vom 14. Juli 1933.

Doch von vorneherein wollen wir uns darüber klar sein, daß die Untersuchungen über das Lebensalter beim Ausbruch der Huntington'schen Chorea selbstverständlich relativen Wert besitzen, — mögen sie noch so intensiv betrieben worden sein — da sie sehr von der Genauigkeit der Beobachtung und Zuverlässigkeit der Mitteilenden abhängig sind. Es mag auch häufig vorkommen, daß sichere objektive Krankheitsercheinungen noch nicht zu erkennen sind, während vielleicht sogar längere Zeit schon subjektive Beschwerden bestanden haben; in diesem Fall gibt uns der Kranke eine im Verhältnis zu den Beobachtungen anderer Personen vorzeitigen Ausbruch der Krankheit an.

Davenport glaubt durch seine beachtenswerten Untersuchungen bewiesen zu haben, daß man mehrere *Biotypen* unterscheiden müsse; so fehlt bei einem Biotyp die Tendenz zum Fortschreiten der choreatischen Bewegungsstörungen; bei einem anderen zeigt sich keinerlei Bewegungsstörung, während die psychischen Defekte stärker in Erscheinung treten; bei einem dritten Biotyp sind die choreatischen

Zuckungen im Vordergrund, während die geistige Erkrankung nicht eintritt; im letzten Biotyp werden die Mitglieder der Familie in einem außerordentlich frühzeitigen Alter befallen. *Entres* schließt daraus, daß diese Unterschiede im Krankheitsbild vererbbarer Natur sind und nicht auf zufällige Verschiedenheiten der Lokalisation des pathologischen Hirnprozesses zurückzuführen sind.

Menzies glaubt erkannt zu haben, daß die Chorea Huntington in gewissen Familien die Neigung zeigt, allmählich immer jüngere Leute zu befallen. *Oppenheim* und vor allem *Heilbronner* wiesen darauf hin, daß die Erkrankung in einzelnen Familien in jeder folgenden Generation früher ausbricht. Diesen als *Anteposition* bezeichneten Vorgang finden wir besonders sinnfällig, wenn die Krankheit in der nachweislich befallenen Generation, die genealogisch erfaßt wird, etwa im Vorgreifenalter deutlich in Erscheinung tritt, in den folgenden Generationen um einige Jahre bis Jahrzehnte früher und schließlich dann schon in den Jahren vor dem heiratsfähigen Alter, sodaß mit dieser Generation die betreffende Familie und damit auch die Krankheit ausstirbt — eine Ausmerze durch die Natur selbst. — Einzelne Forscher wie *Siemens*, *Hoffmann*, *Weinberg* u.a. fassen die Anteposition als ein „harmloses wissenschaftstechnisches Kunstprodukt“ auf. Die *Postposition* spielt eine weniger bedeutungsvolle Rolle.

Bei vielen Huntington-Familien besteht zweifellos der Eindruck, daß für die einzelnen Familien die Gefährdungszone ziemlich eng begrenzt und konstant ist, wobei der Manifestationsbeginn in der betreffenden Generation stark schwanken kann und unter den verschiedenen Familien weit differiert. Bei Sippe Margulies (Dtsh. Zeitschrift für Nervenheilkunde 50, 470) oder Sippe 7 von *Entres* finden wir in 6 Generationen den Manifestationsbeginn zwischen dem 20. und 32. Jahr und bei der einzigen bisher erkannten Person der Sippengeneration im 10. Lebensalter. Bei Fall 6 erkrankten die von der Krankheit Befallenen um das 40. Lebensjahr. Große Schwankungen des Manifestationsbeginns innerhalb der Generationenfolge weist die Familie 15

von Entres auf, in der 2 Brüder mit 42 Jahren, der Vater mit 30 Jahren, die Vatermutter zwischen 40. und 50. Lebensjahr und die Urgroßmutter vor dem 34. Jahr erkrankten; auch die Sippe Stroop, in der in 4 Generationen die entsprechenden Daten lauten: vor dem 40. Jahr, 41. bis 48. Jahr, 43. bis 57. Jahr, 24. (!) Jahr.

Aus der Chorea Huntington Literatur ließen sich noch viele Beispiele von Familien anführen, bei denen das Ausbruchsalter ziemlich konstant ist, bei anderen Familien wieder der Manifestationsbeginn einen weiten Spielraum besitzt.

Es dürften wohl diese großen Unterschiede, die sich zwischen den für die einzelnen Familien typischen Ausbruchzeiten finden mit der unterschiedlichen erbkonstitutionellen Struktur der Familien zusammenhängen. Mit Bestimmtheit dürfen wir annehmen, daß die Erbkonstitution, die genotypische Zusammensetzung, die den einzelnen Familien gemeinsame Anlage eine bedeutende Rolle spielt für das Maß an Widerstandskraft gegen die Entwicklung krankhafter Anlagen. Sicherlich ist ein erhebliches Abweichen von der für die jeweilige Familie maßgebenden Norm des Manifestationsbeginnes durch eine Änderung der erbkonstitutionellen oder somatischen Widerstandskraft durch innere oder äußere Faktoren zu erklären.

Es wurden schon mehrfach Zusammenstellungen über das Ausbruchsalter der Chorea Huntington veröffentlicht, so von *Huet*, *Josef Mayer*, *Wollenberg* benützte 66 schon von Huet überarbeitete und 13 neue Fälle, sodaß seine Tabelle im ganzen 79 Fälle zählt. Er fand bei 59,4% den Krankheitsbeginn zwischen dem 30. und 40. Lebensjahr. In 13,8 % der Fälle brach die Krankheit nach dem 50. Jahr aus, und zwar in je einem Falle (=1,2%) erst zwischen dem 60. und 65. und dem 65. und 70. Lebensjahr. Es wäre verfehlt, jede Chorea, die nach dem 50. Jahr beginnt, voreilig zur *senilen Chorea* stempeln zu wollen. Dies ist schon daraus zu ersehen, daß eine verhältnismäßig große Zahl von einwandfreien Huntingtonfamilien bekannt ist, in denen bei irgend einem Mitglied die Krankheitsercheinungen erst jenseits dieser Altersgrenze auftraten. Es sei

auf die Familien von Stroop, Schlesinger, Frotzcher, Lorenz, Peretti, Curshmann, die Familien Vorster, Buhl, Ries-Ising von Meggendorfer und die von Kehrer beobachteten Familien Pontex und Taube hingewiesen. Man kann also bei einem im höheren Alter mit Huntingtonssymptomen Erkrankten die Diagnose verantworten, zumal wenn der betreffende Elter vor dem Ausbruchsalter seines Kindes gestorben ist, mag er Zeit seines Lebens frei von Chorea-symptomen gewesen sein.

Die aus dem Studium der bisher veröffentlichten Fälle und aus seinem eigenen Material gewonnene Tabelle von *Entres* umfaßt 323 Fälle von Chorea Huntington. Er bedauert, daß seine Tabelle unvollkommen sei, da nur die deutsche Literatur so weit wie möglich lückenlos herangezogen werden konnte und ausländische Publikationen ihm nicht im selben Maße zugänglich waren; außerdem sind zur Aufstellung der Statistik nur solche Fälle verwendet worden, bei denen einwandfrei direkte und gleichartige Erbllichkeit nachzuweisen war.


Aus der nebenstehenden Tabelle von *Entres* ist folgendes zu entnehmen:

In 58,2% aller Fälle liegt der Krankheitsbeginn zwischen dem 31. und 45. Lebensjahr. Bei 25,3% treten die ersten Symptome zwischen dem 36. und 40. Jahr auf. Es ist ferner aus der Tabelle zu ersehen, daß überraschender Weise in fast 40% der hier verarbeiteten Fälle die Krankheit schon vor dem zurückgelegten 30. Lebensjahr oder erst nach dem 45. zum Ausbruch kommt. Für die Richtigkeit der in dieser Statistik angeführten schon vorzeitig erkrankten Fälle von *J. Hoffmann, Jolly, Huet, Berry, D'Antona, Friedenthal, Kalkhof, Wergileffow*, glaubt *Entres* garantieren zu können.

Die Zeit vom 21. bis 60. Lebensjahr stellt doch schließlich das Hauptkontingent (94,1 %) für den Beginn des Leidens dar und *Entres* sagt: „Man wird also als kritisches Alter für den Ausbruch der Huntington'schen Chorea das 21. mit 60. Lebensjahr ansehen müssen.“

Uns interessiert noch ganz besonders an dieser Tabelle,

Manifestationsbeginn bei Huntington'scher Chorea.



daß ein ungeheuer hoher Prozentsatz (77 %) der Chorea Huntington Träger nach dem 30. Lebensjahr erkrankt.

Es ist wohl anzunehmen, daß der weitaus größere Teil von diesen beim Ausbruch der Krankheit eine Ehe geschlossen und Kinder gezeugt, somit eine überaus große Verantwortung gegenüber Volk und Staat übernommen haben.

Die Berechnung der Erkrankungswahrscheinlichkeit für jedes einzelne Lebensalter nach mathematischen Prinzipien würde zu einem exakten Ergebnis führen; doch dürfen wir uns hier diese schwierige und zeitraubende Arbeit wohl ersparen.

Die Huntington'sche Chorea spielt zweifellos nicht die Rolle wie andere Erbkrankheiten, z. B. Epilepsie oder gar die Schizophrenie, aber die Erbbiologie arbeitet insofern auf günstigem Boden, weil die dominante Vererbung, wie sie bei der Huntington'schen Chorea besteht, offen zutage liegt, während die rezessive Vererbung heimtückisch ihr Wesen treibt.

Der erbliche Veitstanz ist eine verhältnismäßig seltene Krankheit, die in manchen Gegenden verschieden häufig auftritt. *R. Jones* schreibt, daß bei 10000 männlichen und weiblichen Kranken des London-County-Asylum zu Clarburburg auf höchstens 3000 Fälle je einer von Huntington'scher Chorea trifft. *A. Fries* aus Kopenhagen teilt mit, daß in den Jahren 1870 bis 90 nur 25 Fälle von erblichem Veitstanz aufgenommen worden sind. Nach *Ulmer* sind in der psychiatrischen Klinik in Würzburg während eines Zeitraums von 30 Jahren bei 3000 Aufnahmen nur 2 Fälle von Huntington'scher Chorea festgestellt worden. In der Heil- und Pflgeanstalt Werneck sind unter den 5216 Neuaufnahmen während 27 Jahren (1890 bis 1917) 2 an chronisch progressiver hereditärer Chorea erkrankt. In der Anstalt Eglfing sind von den in den Jahren 1907 bis 1919 aufgenommenen 12807 Kranken 4 Fälle, in der Anstalt Haar von den in den Jahren 1912 bis 1919 2982 Neuaufnahmen 2 Fälle als Huntington'sche Chorea diagnostiziert worden. In der psychiatrischen Klinik in Kiel dagegen wurden überraschender Weise außerordentlich viele Fälle von Huntington-

ischer Chorea konstatiert; auch *Kihn* in Erlangen schreibt, daß zeitweise in der psychiatrischen Klinik Erlangen bis zu 8 Fälle von erblichem Veitstanz waren. In Deutschland sollen ungefähr 600 Kranke unter das Gesetz fallen.

Da nach dem Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses vom 14. Juli 1933 nur „wer erbkrank *ist*“ unfruchtbar gemacht werden kann, so ist unbedingt mit größter Betonung darauf hinzuweisen, daß die Chorea Huntington Träger zu spät erfaßt werden. Der Manifestationsbeginn liegt, wie wir gesehen haben, meist in einem Alter, in dem der Betreffende schon Kindern, manchmal sogar einer großen Reihe, das Leben geschenkt hat, stets mit der Anwartschaft, daß rund die Hälfte von ihnen — der Zufall entscheidet ob mehr oder weniger — wieder an diesem Leiden erkrankt.

Wir müssen also unsere besondere Aufmerksamkeit den gesunden Mitgliedern von Chorea Huntington Familien zuwenden, ihnen mit Rat und Tat zur Seite stehen, die Schwere dieses Leidens erklären, sie vor der Eingehung einer frühzeitigen Ehe warnen; auch den gesunden Ehepartner muß man auf die schweren eventuellen Folgen für seine Kinder hinweisen. Insbesondere wird man bei psychopathischen Kindern von an erblichem Veitstanz erkrankten Eltern als Eheberater eingreifen, da eine Unfruchtbarmachung dieser bis jetzt noch nicht erlaubt ist. In solchen Familien wird man bei Kindern, die nicht normal oder gesund sind und die erfahrungsgemäß bedeutend mehr als die durchschnittlich gesunden und normalen Kinder der Erbkranken zu eigener späterer Erberkrankung vorbestimmt sind, wenigstens auf möglichst späte Heirat drängen und Kinderlosigkeit befürworten. Bei späterer Heirat können dann später einsetzende Erkrankungen vielleicht noch rechtzeitig erkannt und ihre Träger, bevor schon Kinder oder weitere Kinder vorhanden sind, zur Sterilisierung gebracht werden. Wir müssen auch ernstlich bestrebt sein, die Nachkommen von Choreatikern auf eventuell bestehende Frühsymptome zu prüfen und dauernd zu beobachten, um 1. gesetzliche Beziehungen zu prämorbidem Persönlichkeit und späterer Erkrankung an Chorea zu finden, 2. sie einer möglichst

frühzeitigen Unfruchtbarmachung zuzuführen. Schon Entres glaubt, daß gewisse Beobachtungen aus der prächoreatischen Zeit einzelner Kranken einige Hoffnung erwecken, daß es dereinst einer verfeinerten Diagnostik gelingen werde, schon beim Eintritt in das heiratsfähige Alter die individuelle und generative Prognose sicherzustellen. Die Beobachtung wurde auch auf erbverwandte Beziehungen gelenkt, durch die es schon öfters gelang, die Diagnose in relativ frühem Alter zu stellen und verwandte Fälle, Abortivformen oder formes frustes zu erkennen und gegebenenfalls unter das Gesetz zu fassen. *Meggendorfer* macht darauf aufmerksam, daß bei manchen Kindern der sicheren Fälle sich psychopathische Züge zeigen; ab und zu seien auch leichte Bewegungsstörungen schon im zweiten Jahrzehnt nachzuweisen, manchmal fänden sich in der Blutsverwandtschaft anderweitige striäre Störungen, wie sich auch gelegentlich eine Umwandlung der choreatischen Bewegungen in eine andere Form, etwa Rigor findet. Auch Hyperkeratose und Polycythämie kommt in Huntingtonfamilien vor. Auf solche Prähuntingtonfälle ist wohl in besonderem Maße zu fassen. Es ist klar, daß bei der Überwachung der Huntingtonfamilien auf diese Frühsymptome, besonders den leichteren Bewegungsstörungen geachtet werden muß, um die Erbträger einer frühzeitigeren Unfruchtbarmachung zuzuführen.

Da aber der Erbkrankheitsträger in den meisten Fällen keinerlei Frühsymptome zeigt, er also erst nach Eingehung einer Ehe und Zeugung von erbkranken Kindern unter das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses fällt, so kann man wohl sagen, daß das obengenannte Gesetz den beabsichtigten Zweck, die Fortpflanzung der Huntington'schen Chorea zu verhindern, nur zum kleinsten Teile erfüllen kann. Es ist ein kaum tragbarer Zustand, wenn man bei dem Bestreben, dieses Ziel zu erreichen, auf den noch mangelhaften Stand der Wissenschaft bezüglich der Früherkennung der Krankheit und auf den guten Willen und die Einsicht von bis jetzt choreafreien Huntingtonträgern angewiesen ist.

Eine *vollkommene Ausrottung dieses schweren, unheilbaren Erleidens* muß mit größter Eindringlichkeit gefordert

werden; dies ist natürlich nur durch eine *radikale Maßnahme, durch Unfruchtbarmachung sämtlicher Kinder der an Huntington'scher Chorea Erkrankten* zu erreichen. Damit würden aber auch die Gesunden (frei von krankhafter Erb-anlage), die man von den Krankheitsträgern noch nicht zu unterscheiden weiß, ihre Zeugungsfähigkeit verlieren.

Der oft erhobene Einwand, daß das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses ungewollt zugleich die Produktion wertvoller, zumindestens eugenisch unbedenklicher Menschen verhindert, besteht als zu Recht. Das wird leider nie zu umgehen sein, da die Eigenart des Erbganges uns im Einzelfall nie vorausagen läßt, ob bei einer bestimmten Zeugung die eine oder die andere Möglichkeit verwirklicht wird. Die Bestimmung, welche Art von Keimzellen bei einer Begattung zur Befruchtung gelangt, trifft allein der Zufall. Wir müssen uns in die Lage des Chirurgen denken, der bei der Entfernung bösartiger Geschwülste vorsichtshalber etwas mehr vom Gesunden mitnimmt, um ja sicher zu gehen, das krankhafte vollkommen beseitigt zu haben.

Man könnte es tatsächlich einmal wagen, durch die obengenannte radikale Sterilisierungsmaßnahme der Zeit voranzueilen, zumal es sich — wie wir gesehen haben — um eine seltene, schwere, unheilbare, im dominanten Erbgang entstehende Krankheit handelt. Es würde nur eine verhältnismäßig geringe Zahl von gesunden Menschen sterilisiert werden, dabei keineswegs hervorragende Familienanlagen ausgerottet werden, da, so weit bekannt ist, in Choreatikerfamilien der Durchschnitt körperlicher und geistiger Qualitäten nach keiner Richtung hin überschritten, im Gegenteil oft nicht erreicht wurde.

Nach Jahrzenten würde man die Huntington'sche Krankheit nur den Namen nach mehr kennen — *fürwahr, ein erstrebenswertes Ziel.*

Zum Schluß ist es mir eine angenehme Pflicht, Herrn Geheimrat Professor Dr. Specht für die freundliche Überlassung und liebenswürdige Durchsicht der Arbeit meinen wärmsten Dank auszusprechen.

Literatur-Verzeichnis.

- Bauer-Fischer-Lenz*, Menschliche Erblchkeitslehre, Band 1, I. F. Lehmann München, 1927.
- Bumke*, Handbuch der Geisteskrankheiten, Springer Berlin, 1928.
- Entres*, Zur Klinik und Vererbung der Huntington'schen Chorea. Monogr. aus dem Gesamtgeb. der Neurol. und Psych., Heft 27.
- Gräf*, Vererbungslehre, Rassenkunde und Erbgesundheitspflege, I. F. Lehmann München, 1934.
- Gosney-Paul Popenoe-Burckhardt*, Sterilisierung, Marcus u. Weber Berlin-Köln, 1930.
- Jakob*, Die extrapyramidalen Erkrankungen, Springer Berlin 1923.
- Kahn*, Erbbiologische Einleitung, Deitcke Leipzig-Berlin, 1925.
- Kehrer*, Erblchkeit und Nervenleiden, Springer Berlin, 1928.
- Kihn*, Die Choreakrankheiten und die choreatischen Symptome. Manuskript, o. J.
- Kühn-Stemmler-Burkdörfer-Woltereck*, Erdkunde, Rassenpflege, Bevölkerungspolitik, Quelle und Mayer Leipzig, 1935.
- Lenz*, Menschliche Auslese und Rassenhygiene (Eugenik), J. F. Lehmann München, 1931.
- Luxenburger*, Eugenik, 1931, II. Band.
- Muckermann*, Eugenik, 1930, I. Band.
- Riggenbach-Werthemann*, Ztbl. 1934.
- Rudin-Gütt-Ruttke*, Zur Verhütung erbkranken Nachwuchses. J. F. Lehmann München, 1954.
- Rudin*, Erblehre und Rassenhygiene. J. F. Lehmann München 1934.
- Stämmeler*, Rassenpflege im völkischen Staat. J. F. Lehmann München 1931.
- Wessle*, Nervenarzt 1933.
- Ziegler*, Die Vererbungslehre in der Biologie und in der Soziologie. Fischer Jena, 1918.

Dissertationen.

- Kamsmeier, Kiel 1902.
- Mammen, Kiel 1910.
- Prißmann, Erlangen 1922.
- Grüber, München 1922.
- Nathan, Bonn 1913.
- Neumann, Leipzig 1913.
- Greve, Rostock, 1913.
- Stahl, Kiel 1914.
- Herrmann, Kiel 1919.
- Stroop, Marburg 1919.
- Kook, Göttingen 1919.
- Bruhn, Kiel 1915.
- Venn, Bonn 1919.
- Ennen, Kiel 1911.
- Fiedler, Kiel 1910.

Lebenslauf.

Martin Herrmann wurde am 29. Januar 1908 zu Vohburg a. Donau als Sohn des Chorrektors Michael Herrmann geboren. Nach 4 Jahren Volkschulbesuch besuchte er das Neue Gymnasium zu Regensburg, 1922 das Progymnasium zu Fordheim und 1925 das Gymnasium zu Münnerstadt, wo er 1928 die Reifeprüfung bestand. Er studierte 6 Semester an der Universität zu Würzburg und 5 an der Universität zu Erlangen; dort bestand er im Juli 1934 die ärztliche Prüfung. Seit dieser Zeit ist er als Medizinalpraktikant an der Heil- und Pflegeanstalt Erlangen tätig. Während der Praktikantenzeit wurde diese Arbeit angefertigt.
